



пшеница мягкая яровая (*Triticum aestivum* L.)

ТОККАТА (ТОССАТА)[®]

Оригинатор:
SELGEN A.S., Чехия



Разновидность: лютеценс

Тип сорта: высокоинтенсивный сорт с прекрасной устойчивостью к полеганию и болезням

Урожайность (максимальная)

98,7 ц/га (Курская область)

Госреестр

Центральный, Центрально-Черноземный регионы

Особенности развития

Среднеспелый сорт, средней длины и хорошо устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартов. Сорт созревает на 3-5 дней позже стандартного сорта Ликамеро

Срок сева

Оптимальный для региона

Вегетационный период

79-97 дней

Норма высева (всхожих семян/м²)

420-460 шт./м² – ранние сроки посева, хороший предшественник. 460-520 шт./м² – поздний посев, плохой предшественник. В засушливых условиях Казахстана норма высева снижается до 300-350 шт./м²

Масса 1000 зерен

33-47 г

Агрофон

В зависимости от предшественника внесение азотных удобрений 50-60 кг/га д.в. при посеве, выход в трубку 30-40 кг/га д.в. и жидкими удобрениями на качество 10-20 кг/га д.в. в колошение

Устойчивость к болезням

Умеренно устойчив к мучнистой росе, в полевых условиях бурой ржавчиной поражен слабо

Особенности защиты

Протравливание семян фунгицидом и инсектицидом никотинойдной группы. При высоком уровне урожайности применение фунгицидов в ЕС29-31 и 49-51. Кратность добавления инсектицидов в смеси или отдельных инсектицидных обработок зависит от численности вредителей

Направление использования

Хлебопекарное (хороший филлер)